

NOUVEAUX COLÉOPTÈRES EXOTIQUES,

PAR M. M. PIC.

Les espèces ci-dessous décrites appartiennent aux collections du Muséum national de Paris et, à l'exception de *Callirhipis Raui*, ont été recueillies au Mozambique par mon ami J. Surcouf.

Callirrhapis Raui nov. sp.

Elongatus, rufo-testaceus, griseo sat sparse pubescens ♂, *aut fere glaber et nitidus* ♀.

Allongé, brillant, roux testacé, presque glabre chez ♀, ou revêtu chez ♂ d'une pubescence grise courte, assez régulière, sans mouchetures distinctes, peu brillant en dessus chez ♂, très brillant chez ♀. Tête rugueuse, front relevé entre les antennes qui sont très longuement flabellées ♂, ou longuement pectinées ♀; prothorax court et large, un peu rétréci en avant avec les angles antérieurs saillants, impressionné de chaque côté de la base et marqué de fossettes, obliques 2 à 2, devant l'écusson, à ponctuation dense chez ♂, plus ou moins fine et espacée chez ♀; écusson grand, densément ♂, ou peu ♀, ponctué; élytres longs, à peine plus larges que le prothorax, atténués postérieurement, à rebord marqué, à ponctuation plus forte et plus rapprochée chez ♂, à côtes discales à peine indiquées; pattes moyennes, cuisses peu épaisses.

Longueur : 14-18 millimètres. — Haut-Tonkin (C. Rau, *in coll.* Ph. François = coll. Bedel).

Espèce distincte, à première vue, par sa coloration générale d'un roux clair. Voisin de *C. Salvazai* Pic avec, chez ♀, la ponctuation bien plus écartée sur le prothorax et celui-ci différemment impressionné.

Attagenus basalis nov. sp.

Oblongus, parum nitidus, niger, membris abdomineque apice rufis, capite, thorace elytrisque ad basim dense aurato pubescentibus.

Oblong, peu brillant, noir, avec le prothorax ayant une transparence brunâtre, les membres et l'abdomen en partie roux, avant-corps et base des élytres revêtus d'une pubescence dense à reflets dorés. Prothorax court et large, rétréci en avant, sinué postérieurement, à lobe médian assez saillant et subarrondi, à ponctuation fine et dense; élytres de la largeur du

prothorax, peu longs, atténués postérieurement, plus densément ponctués à la base, densément pubescents sur le tiers basal, éparsément et peu distinctement sur le reste.

Longueur : 3,5 millimètres. — Caia, 20, XII, 1925. Un seul exemplaire.

Peut se placer près de *A. rufiventris* Pic, dont il se distingue, à première vue, par la pubescence régulière et dense de l'avant-corps et de la base des élytres.

Mesocœlopus Surcoufi nov. sp.

Oblongus, convexus, nitidus, rufus, sat regulariter et parum dense griseo-pubescentis, membris testaceis.

Oblong, convexe, brillant, roux, orné d'une pubescence grise assez régulière et peu dense. Antennes testacées, longues, un peu dentées avec le dernier article très long; prothorax assez court et large, à ponctuation plus ou moins fine et rapprochée, régulièrement et peu densément pubescent; écusson grand, presque en demi-cercle; élytres assez courts, atténués postérieurement, bombés sur le milieu et comprimés sur les côtés, à ponctuation fine et peu dense; pattes testacées.

Longueur 2-2,5 millimètres. — Cauxixe et Barue, nombreux exemplaires in M. Paris et coll. Pic.

Voisin de *M. rufescens* Pic, en diffère par l'écusson plus grand et la pubescence plus régulière du prothorax.

Gonocnemis Surcoufi nov. sp.

Oblongus, fere opacus, griseo pubescens, rufus, antennis medio et apice piceis, articulo ultimo piriforme, apice pallidiore.

Oblong, presque opaque, pubescent de gris, roux avec des antennes de poix, à base rousse et dernier article plus clair au sommet, yeux rapprochés; antennes assez longues, peu épaisses, à articles en partie obconiques, dernier pyriforme, acuminé et plus clair à l'apex; prothorax assez court et peu large, un peu rétréci en avant et en arrière, subangulé vers le milieu, ruguleusement ponctué, orné postérieurement de 3 carènes assez largement 4 impressionnées; élytres plus larges que le prothorax, un peu allongés, atténués à l'extrémité, largement sillonnés et marqués de points subcarrés médiocres, intervalles élevés en côtes peu saillantes, la présuturale surtout; pattes robustes.

Longueur : 8 millimètres. — Cauxixe, un seul exemplaire.

Paraît voisin de *G. reflexicollis* Fairm., en diffère par le prothorax tricaréné postérieurement, le dernier article des antennes non tronqué, ces organes en partie foncés, la coloration plus claire.